

O que hacer si tiene síntomas después de la vacuna del COVID-19 (nuevo coronavirus)

Síntomas que pueden aparecer días después de la vacuna

* Es más probable que aparezcan después de la 2a vacunación que tras la 1a

- Hinchazón o dolor en el lugar de la inyección ⌚ Del día de inoculación, por aprox. 2 días
- Dolor muscular, dolor de articulaciones ⌚ Del día siguiente, por aprox. 2 días
- Dolor de cabeza ⌚ Del día siguiente, por aprox. 2 días
- Malestar, escalofríos, fiebre ⌚ Del día siguiente, por aprox. 2 días



※ Puede causar fatiga, náuseas o diarrea / vómitos

Fuente: Panfleto explicativo de reacciones Secundarias de la Asociación Médica de Japón

Estos síntomas desaparecerán en unos días
Por favor observe cómo evolucionan

Si tiene fiebre / dolor intenso

Se puede tomar analgésicos y antifebriles sin receta, pero si no está seguro, consulte su **médico, farmacéutico o farmacia**



¡Antes de acudir al ambulatorio de urgenencias!



Si continúan teniendo síntomas

Consulte la

Ventanilla Especializada de Vacunas de la Prefectura

Consultas sobre efectos secundarios ※Sobre la reserva y informaciones sobre la vacuna en el Centro de Atención de su municipalidad

Ventanilla especializada sobre vacunas contra el COVID-19 de la prefectura de Shiga

FAX 077-528-4867

9:00~18:00 TEL 077-528-3588

18:00~9:00 TEL 077-528-3621