

# O que fazer caso você tenha algum problema (mal-estar) após a vacina contra o coronavírus



## Sintomas que podem aparecer no período de até alguns dias após a vacinação

※Estes sintomas podem ocorrer após a primeira dose, mas têm mais chances de aparecer após a segunda dose da vacina.

- Inchaço/dor no local da injeção (L) Pode começar no dia da injeção e durar aproximadamente dois dias.
- Dor muscular, dor nas articulações (L) Pode começar no dia seguinte à injeção e durar aproximadamente um dia.
- Dor de cabeça (L) Pode começar no dia seguinte à injeção e durar aproximadamente um dia.
- Indisposição, calafrios, febre (L) Pode começar no dia seguinte à injeção e durar aproximadamente um dia.



※ Também pode ocorrer fadiga, enjoo, diarreia e vômito.

Fonte: Folheto da Associação Médica do Japão a respeito dos efeitos colaterais da vacina e outras informações.

Esses sintomas devem desaparecer depois de alguns dias, **então pedimos que você observe o seu estado de saúde.**

### Caso você sofra com muita febre ou dor

Você pode tomar algum remédio que tenha ação analgésica e antipirética desses vendidos em farmácia para tratar os sintomas. Caso fique preocupado sem saber o que fazer, pode se consultar com o **seu médico**, com um **farmacêutico** etc.



### Caso os sintomas continuem

Primeiro entre em contato com a Central de atendimento exclusiva da província para a vacinação contra o coronavírus.

Use o número abaixo para dúvidas em relação a efeitos colaterais etc.

※No caso de dúvidas em relação a reservas e outras questões do tipo, entre em contato com a central de atendimento do seu município.

Central de atendimento exclusiva da província de Shiga para a vacinação contra o coronavírus

**FAX 077-528-4867**

9:00~18:00

**TEL 077-528-3588**

18:00~9:00

**TEL 077-528-3621**