

Mga bagay na dapat malaman kung magkaroon ng mga epekto pagkatapos magpabakuna ng COVID-19

Mga sintomas na maaring maramdaman sa loob ng ilang araw pagkatapos ng pagbabakuna

※Malimit na nararamdaman ito sa pangalawang bakuna kaysa sa pang-una.

- | | |
|--|--|
| ● Pamamaga at sakit sa parte ng Injeksiyon | 🕒 Tumatagal ito ng halos 2 araw mula sa mismong araw ng bakuna |
| ● Masakit na kalamnan at kasukasan | 🕒 Kinabukasan ~ at sunod na araw |
| ● Sakit ng ulo | 🕒 Kinabukasan ~ at sunod na araw |
| ● Pagod , Panginginginig, Lagnat | 🕒 Kinabukasan ~ at sunod na araw |



Mula sa : Japan Medical Association side reaction leaflet

※ Pagkahapo, Pagduwal, Pagtatae at Pagsusuka ay maaring maramdaman

Ang mga sintomas na ito ay mawawala sa loob ng ilang araw
Mangyaring maghinatay sandali

Kung may matinding lagnat at pananakit

Sinasabing maaring uminom ng over-the-counter

Na antipyretic analgesics ngunit kung hindi ka sigurado,

Mangyaring kumunsulta sa doktor, parmasyutiko o parmasya



Para sa mga may patuloy na sintomas

Una sa lahat , mangyaring kumunsulta sa tanggapan ng Shiga COVID-19 Vaccine Contact Center

Para sa mga katanungan tungkol sa sintomas

※Para sa reserbasyon sa pagpabakuna mangyaring makipag ugnayan sa tanggapan ng munusipyo

Shiga COVID-19 Vaccine Contact Center

FAX 077-528-4867

9:00am~6:00pm

TEL 077-528-3588

6:00pm~9:00am

TEL 077-528-3621